

Antivirales y La influenza Porcina

(4/29/09)

¿Quién debe de tomar antivirales?

La recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) es que se dé prioridad a pacientes hospitalizados y pacientes de alto riesgo de complicaciones de la influenza para tratarlos con antivirales. Funcionarios de Salud Pública **no** recomiendan tomar antivirales para prevenir la influenza porcina. Debido a que el abastecimiento de antivirales es limitado, es muy importante que los proveedores de la salud reserven su uso para los que están enfermos y de alto riesgo.

Las personas que padezcan síntomas parecidos a la influenza común deben llamar a su médico. Si usted tiene gripe, su médico puede determinar si el tratamiento adecuado para usted es antivirales.

¿Que tan seria es la influenza porcina?

En los Estados Unidos la mayoría de la gente que se ha enfermado de la influenza porcina ha presentado síntomas ligeros (similares a los de la gripe) y se han recuperado ellos solos con muy poco o ningún tratamiento médico.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza porcina en humanos?

Los síntomas de la influenza porcina en personas son similares a los de la influenza común e incluyen:

- Fiebre de más de 100°,
- cansancio,
- falta de apetito y
- tos o estornudos.
- Algunas personas con la influenza porcina han reportado nariz congestionada, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.